



Příbalová informace

**INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**

# ALOMIDE®

## OČNÍ KAPKY, ROZTOK

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE:

**ALCON-COUVREUR**, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgie.

### SLOŽENÍ:

Léčivá látka:

Lodoxamidum trometamolium 1,78 mg (odpovídá Lodoxamidum 1 mg) v 1 ml sterilních očních kapek.

Pomocné látky:

Benzalkonium-chlorid (konzervační látka), manitol, dihydrát edetanu disodného, hypromelóza 2910, dihydrát citronanu sodného, monohydrát citronové kyseliny, tyloxapol, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková 35 % k úpravě pH, čištěná voda.

### INDIKAČNÍ SKUPINA:

Oftalmologikum.

### CHARAKTERISTIKA:

Léčivá látka lodoxamid-trometamol tlumí průběh reakcí, které probíhají v rohovce a spojivce při jejich zánětu alergického původu.

### INDIKACE:

Přípravek se používá k léčení příznaků provázejících oční alergická onemocnění jako jsou vernální konjunktivitida (alergický zánět spojivky), vernální keratitida (alergický zánět rohovky) nebo vernální keratokonjunktivitida (současně probíhající alergický zánět rohovky a spojivky). Přípravek může být používán u dospělých a dětí starších než 4 roky.

### KONTRAINDIKACE:

ALOMIDE® se nesmí používat při přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku.

Jako u všech přípravků obsahujících benzalkonium-chlorid, by se uživatelé měkkých kontaktních čoček měli v průběhu léčby očními kapkami ALOMIDE® vyhnout jejich používání.

Přípravek by neměl být používán u dětí mladších než 4 roky.

V těhotenství a v období kojení může být přípravek používán jen tehdy, je-li to nezbytně nutné.

## NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Přípravek je obvykle dobře snášen, po nakapání se však mohou vyskytnout přechodné pocity pálení, píchání nebo svědění oka a může dojít k slzení oka.

Při používání přípravku se mohou dále vyskytnout i pocit suchosti oka, rozostřené vidění, pocit cizího tělíska v oku, překrvení spojivek, zahlenění oka.

Zřídka se mohou vyskytnout šupinky na víčkách nebo řasách, bolesti oka, poškození povrchu rohovky, pocit tepla v oku, otok spojivky nebo víček, zánět rohovky nebo víček.

Zřídka se mohou vyskytnout i celkové nežádoucí účinky, jako je bolest hlavy a vzácně pocity tepla, závratě, ospalost, žaludeční nevolnost, kýčání, pocit suchosti v nose a kožní vyrážky.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se porad'te se svým očním lékařem.

## INTERAKCE:

Interakce nejsou dosud známy. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s přípravkem ALOMIDE<sup>®</sup> žádné další oční přípravky.

## DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ:

Přesné dávkování i délku léčby vždy určí lékař.

Obvyklá dávka pro dospělé i děti od 4 let věku je 1-2 kapky vkápnuté do spojivkového vaku postiženého oka (postižených očí) 4krát denně v pravidelných intervalech.

Léčba přípravkem může trvat několik týdnů, ale i několik měsíců a podle průběhu onemocnění o jejím trvání rozhodne lékař. Ukončit používání přípravku je možné pouze na doporučení lékaře.

## UPOZORNĚNÍ:

- ALOMIDE<sup>®</sup> neovlivňuje schopnost řídit auto ani ovládání strojů.
- Účinnost léčby přípravkem ALOMIDE<sup>®</sup> závisí na pravidelném používání přípravku podle doporučení lékaře. Jestliže zapomenete vkápnout jednu z pravidelných dávek, vkápněte ji co nejdříve si vzpomenete, a dále pokračujte v používání přípravku podle původního časového rozvrhu. Vynecháte-li více dávek, porad'te se o dalším postupu s ošetřujícím lékařem.
- Ústí kapacího uzávěru se nesmí dotknout oka, obličeje ani jiné části těla či jiného předmětu.
- Po prvním otevření kapací lahvičky nesmí být přípravek používán déle než 4 týdny. Po každém použití musí být kapací lahvička dobře uzavřena.

### Předávkování

Při místním předávkování (nakapání více kapek) vypláchněte oko proudem vlažné vody.

Při náhodném požití přípravku (a to zvláště dítětem), které nemusí vyvolat žádné příznaky, ale mohly by se po něm projevit pocity tepla nebo zarudnutí pokožky obličeje, bolesti hlavy, závratě, pocit únavy, pocení, nucení na zvracení, průjem, nucení na močení a častější močení, se porad'te s lékařem.

## UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Zlikvidujte 4 týdny po prvním otevření.

## VAROVÁNÍ:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

## BALENÍ:

5 nebo 10 ml sterilních očních kapek v plastické lahvičce s kapacím uzávěrem.

**DATUM POSLEDNÍ REVIZE:** 13.02.2008