

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

EMADINE 0,5 mg/ml, Oční Kapky, roztok.
Emedastinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci, pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek EMADINE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EMADINE používat
3. Jak se přípravek EMADINE používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek EMADINE uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK EMADINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

EMADINE je léčivý přípravek, který se používá k léčbě sezónního alergického zánětu spojivek očí (alergický stav oka). Snižuje intenzitu alergické reakce.

Alergický zánět spojivek. Některé látky (alergeny) jako jsou pyly, domácí prach nebo zvířecí srst mohou způsobovat alergickou reakci, která se projevuje svěděním, zarudnutím oka nebo také otoky v okolí Vašich očí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EMADINE POUŽÍVAT

Nepoužívejte EMADINE...

- **jestliže jste alergický(á)** na emedastin nebo na kteroukoliv další složku.

Porad'te se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku EMADINE je zapotřebí...

- **Nepoužívejte EMADINE pro léčbu dětí mladších než 3 roky.**
- **Jestliže nosíte kontaktní čočky**, prosím přečtěte si bod „Důležité informace o některých složkách přípravku Emedine“ níže.
- **EMADINE není doporučován** pro léčbu pacientů ve věku vyšším nad 65 let, pro tuto věkovou skupinu nebyly provedeny žádné klinické studie.

- **Používání přípravku EMADINE není doporučováno** pacientům s problémy ledvin a jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže současně s přípravkem EMADINE používáte ještě další oční léčivé přípravky, postupujte podle informací v odstavci 3 „Jak se EMADINE používá“.

Těhotenství a kojení

- **Jestliže jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět, a nebo** pokud kojíte. Poradte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete zjistit, že Vaše vidění je po určitou dobu po použití EMADINE rozostřené. Neřid'te, dokud nebudete vidět jasně.

Důležité informace o některých složkách přípravku EMADINE

Konzervační látka v přípravku EMADINE (benzalkonium-chlorid) může způsobit podráždění oka a je o něm známo, že zbarvuje měkké kontaktní čočky. Z tohoto důvodu nepoužívejte kapky pokud máte kontaktní čočky nasazené v oku. Vyčkejte nejméně 15 minut po nakapání, než si kontaktní čočky opět nasadíte.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK EMADINE POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek EMADINE přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství nakapat

Dospělí a děti ve věku 3 roky a více: **Jedna kapka do oka, dvakrát denně.**

Používejte toto dávkování, pokud Vám Váš lékař nepředepsal jiné. Užívejte přípravek tak dlouho, jak Vám určil Váš lékař. Kapky použijte do obou očí pouze v případě, pokud Vám to řekl Váš lékař.

Kapky používejte pouze do očí.


Otočte stránku pro více informací

Nyní otočte>

3. JAK SE PŘÍPRAVEK EMADINE POUŽÍVÁ (pokračování)



1



2

Jaké množství nakapat
<viz strana 1

- Připravte si lahvičku s přípravkem EMADINE a zrcátko.
- Umyjte si ruce.
- Vezměte lahvičku a odšroubujte uzávěr.
- Lahvičku držte hrotem dolů mezi palcem a prostředníčkem.
- Zakloňte hlavu dozadu. Čistým prstem si stáhněte víčko dolů tak, aby se mezi očním víčkem a okem vytvořila jakási „kapsa“. Tam se umístí kapka (viz obr. 1).
- Hrot lahvičky dejte těsně k oku. Můžete si pomoci zrcátkem.
- **Hrotem lahvičky se nedotýkejte oka nebo očního víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů.** Oční kapky by se tím mohly znečistit.
- **Lehce zatlačte na dno lahvičky** tak, aby se uvolnila jedna kapka EMADINE.
- **Lahvičku nestlačujte;** je vyrobena tak, aby k uvolnění kapky stačil lehký tlak na dno (obrázek 2).
- Pokud máte kapat do obou očí, pokračujte stejným způsobem u druhého oka.
- Ihned po použití nasad'te pevně zpět uzávěr.

Jestliže nedopatřením EMADINE požijete nebo se použije k injekční aplikaci, okamžitě kontaktujte lékaře. Mohlo by dojít k poruše Vášeho srdečního rytmu.

Jestliže se vám vkápnout do oka nepodaří, celý úkon opakujte.

Jestliže si do oka nakapete příliš velké množství, oko vypláchněte sterilním fyziologickým roztokem, pokud není k dispozici, použijte vlažnou vodu. Další kapky již do oka nekapejte a vyčkejte do doby další aplikace dle pravidelného dávkovacího režimu.

Jestliže jste zapomněl(a) použít EMADINE v pravidelnou dobu, vkápněte si jednu kapku hned jakmile si vzpomenete a pak se vraťte ke svému pravidelnému dávkovacímu schématu. **Nezdvojujte** následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Používáte-li ještě jiné oční kapky, zachovejte mezi aplikací EMADINE a jiných přípravků interval alespoň 10 minut.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky i přípravek EMADINE může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ty mohou být nepříjemné, většina z nich však rychle odezní.

Obvykle můžete v používání kapek pokračovat, pokud nejsou účinky závažné. Máte-li obavy, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky

(objevují se u 1 až 10 uživatelů ze 100)

Účinky na oko: bolest oka, podráždění oka, rozmazané vidění, skvrny na rohovce, suché oko, svědění oka, červené oko

Celkové nežádoucí účinky: bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky

(objevují se u 1 až 10 uživatelů z 1000)

Účinky na oko: poškození rohovky, abnormální pocit v očích, zvýšené slzení, unavené oči

Celkové nežádoucí účinky: obtíže se spánkem, bolest dutin hlavy, špatná chuť, vyrážka

Není známo:

(četnost výskytu nemůže být vzhledem k dostupným údajům odhadnuta)

Celkové nežádoucí účinky: zvýšená srdeční frekvence

Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK EMADINE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek EMADINE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedeném na lahvičce a papírové krabičce za „EXP“ (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C

Čtyři týdny po prvním otevření lahvičku zlikvidujte, aby se zabránilo kontaminaci přípravku. Zapište datum otevření **každé lahvičky** na štítek lahvičky a na krabičce na vyznačené místo.

Otevřeno:

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek EMADINE obsahuje

Léčivou látkou je emedastinum 0.5 mg/ml jako difumarát.

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid; trometamol; chlorid sodný; hypromelosa; čištěná voda. Kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný (k úpravě pH), čištěná voda. Malé množství kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu sodného se přidává proto, aby se udržely normální hodnoty kyselosti (úrovně pH).

Jak přípravek EMADINE vypadá a co obsahuje toto balení

EMADINE je kapalina (roztok), dodávaná v balení, obsahujícím 5 ml nebo 10 ml plastovou (DROP-TAINER) lahvičku se šroubovacím uzávěrem. Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Alcon Laboratories (UK) Ltd.,
Pentagon Park
Boundary Way,
Hemel Hempstead,
Herts., HP2 7UD,
Velká Británie.

Výrobce

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rijksweg 14,
B-2870 Puurs,
Belgie

Výrobce

Alcon Cusí, S.A.,
Camil Fabra 58,
08320 El Masnou,
Španělsko

Pro další informace o tomto přípravku prosím kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
SA Alcon-Couvreur NV
☎ + 32 (0)3 890 27 11 (België/Belgique/Belgien)

България
Алкон България ЕООД
☎ + 359 2 950 15 65

Česká republika
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
☎ + 420 225 377 333

Danmark
Alcon Danmark A/S
☎ + 45 3636 3434

Deutschland
Alcon Pharma GmbH
☎ + 49 (0)761 1304-0

Ελλάδα
Κύπρος
Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ
☎ + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

Eesti
Alcon Eesti
☎ + 372 6 313 214

España
Alcon Cusí, S.A.
☎ + 34 93 497 7000

France
Laboratoires Alcon
☎ + 33 (0)1 47 10 47 10

Ireland
Malta
United Kingdom
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
☎ + 44 (0) 1442 34 1234 (United Kingdom)

Ísland
Alcon Danmark A/S
☎ + 45 3636 3434

Lietuva
Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė
☎ + 370 5 2 314 756

Magyarország
Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft
☎ + 36-1-463-9080

Nederland
Alcon Nederland BV
☎ + 31 (0) 183 654321

Norge
Alcon Norge AS
☎ + 47 23 25 25 50

Österreich
Alcon Ophthalmika GmbH
☎ + 43 (0)1 596 69 70

Polska
Alcon Polska Sp. z o.o.
☎ + 48 22 820 3450

Portugal
Alcon Portugal-Produtos e Equipamentos
Oftalmológicos, Lda.
☎ + 351 214 400 300

România
S.C. Alcon Romania S.R.L
☎: + 40 21 203 93 24

Slovenija
Alcon d.o.o.
☎ + 386 1 422 5280

Slovenská republika
Alcon Pharmaceuticals Ltd – oz
☎ + 421 2 5441 0378

Suomi/Finland
Alcon Finland Oy
☎ +358 207 871 600

Italia

Alcon Italia S.p.A.
☎ + 39 02 81803.1

Sverige

Alcon Sverige AB
☎ + 46 (0)8 634 40 00
E-post: receptionen@alconlabs.com

Latvija

Alcon Pharmaceuticals Ltd
☎ + 371 7 321 121

Tato příbalová informace byla naposledy schválena Listopad 2010

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) www.ema.europa.eu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

EMADINE 0,5 mg/ml Oční Kapky, roztok, jednodávkový obal.
Emedastinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci. Možná ji budete potřebovat číst znovu. Máte-li případně další otázky, zeptejte se prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám osobně. Nesmíte jej podat žádné další osobě. Mohl by jí ublížit a to i tehdy, pokud její symptomy jsou stejné jako Vaše.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek EMADINE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EMADINE používat
3. Jak se přípravek EMADINE používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek EMADINE uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK EMADINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

EMADINE je léčivý přípravek, který se používá k léčbě sezónního alergického zánětu spojivek očí (alergický stav oka). Snižuje intenzitu alergické reakce.

Alergický zánět spojivek. Některé látky (alergeny) jako jsou pyly, domácí prach nebo zvířecí srst mohou způsobovat alergickou reakci, která se projevuje svěděním, zarudnutím oka nebo také otoky v okolí Vašich očí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EMADINE POUŽÍVAT

Nepoužívejte EMADINE...

- **jestliže jste alergický(á)** na emedastin nebo na kteroukoliv další složku.

Porad'te se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku EMADINE je zapotřebí...

- **Nepoužívejte EMADINE pro léčbu dětí mladších než 3 roky.**
- **EMADINE není doporučován** pro léčbu pacientů ve věku vyšším nad 65 let, pro tuto věkovou skupinu nebyly provedeny žádné klinické studie.
- **Používání přípravku EMADINE není doporučováno** pacientům s problémy ledvin a jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže současně s přípravkem EMADINE používáte ještě další oční léčivé přípravky, postupujte podle informací v odstavci 3 (Jak se EMADINE používá).

Těhotenství a kojení

- **Jestliže jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět, a nebo** pokud kojíte. Poradte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete zjistit, že Vaše vidění je po určitou dobu po použití EMADINE rozostřené. Neřídte, dokud nebudete vidět jasně.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK EMADINE POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek EMADINE přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství nakapat

Dospělí a děti ve věku 3 roky a více: Jedna kapka do oka, dvakrát denně.


Používejte toto dávkování, pokud Vám Váš lékař nepředepsal jiné. Užívejte přípravek tak dlouho, jak Vám určil Váš lékař. **Kapky použijte do obou očí pouze** v případě, pokud Vám to řekl Váš lékař.

Kapky používejte pouze do očí.


Otočte stránku pro více informací

Nyní otočte>


3. JAK SE PŘÍPRAVEK EMADINE POUŽÍVÁ (pokračování)



1



2



3

Jaké množství nakapat
<viz stranu 1

Nepoužívejte jednodávkový obal - ampulku, která již byla otevřena. Nepoužívejte žádnou uzavřenou ampulku z ochranného fóliového přebalu, který byl otevřen déle než týden.

- Roztrhněte ochranný fóliový přebal a vyjměte pás pěti ampulek.
- **Nepoužívejte, pokud je roztok zakalený nebo obsahuje částice.**

- Držte pás dlouhou plochou stranou nahoru a oddělte ampulku tahem směrem k sobě, zatímco ostatní pevně držíte. Pokud ampulky pevně drží, bude potřeba je od sebe odломit (obrázek 1).
- Odeberte jednu ampulku. Ostatní vraťte do ochranného přebalu.
- Ujistěte se, zda máte po ruce zrcátko a umyjte si ruce.
- Držte ampulku za plochý konec mezi palcem a ukazováčkem a otevřete ji zakroucením druhého konce. (obrázek 2).
- Zakloňte hlavu. Stáhněte čistým prstem víčko směrem dolů tak, aby se mezi víčkem a okem vytvořila jakási “kapsa”. Tam vkápneme přípravek.
- Držte ampulku mezi palcem a ostatními prsty otevřeným koncem směrem dolů.
- Hrot ampulky dejte těsně k oku. Můžete si pomoci zrcátkem.
- **Hrotem ampulky se nedotýkejte oka nebo očního víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů.** Oční kapky by se tím mohly znečistit.
- Lehce zatlačte na ampulku tak, aby se uvolnila jedna kapka do kapsy mezi očním víčkem a okem (obrázek 3).
- Pokud Vám lékař řekl, že máte přípravek používat do obou očí, pokračujte stejným způsobem u druhého oka - použijte stejnou ampulku.
- **Vyhod'te ampulku včetně zbývajících roztoku.**
- **Vyhod'te všechny nevypotřebované ampulky z ochranného přebalu, který byl otevřen déle než týden-i když jsou ampulky stále uzavřené.**

Jestliže nedopatřením EMADINE požijete nebo se použije k injekční aplikaci, okamžitě kontaktujte lékaře. Mohlo by dojít k poruše Vášeho srdečního rytmu.

Jestliže se vám vkápnout do oka nepodaří, celý úkon opakujte.

Jestliže si do oka nakapete příliš velké množství, oko vypláchněte sterilním fyziologickým roztokem, pokud není k dispozici, použijte vlažnou vodu. Další kapky již do oka nekapejte a vyčkejte do doby další aplikace dle pravidelného dávkovacího režimu.

Jestliže jste zapomněl(a) použít EMADINE v pravidelnou dobu, vkápněte si jednu kapku hned, jakmile si vzpomenete a pak se vraťte ke svému pravidelnému dávkovacímu schématu. **Nezdvojujte** následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Používáte-li současně ještě jiné oční kapky, zachovejte mezi aplikací EMADINE a jiných přípravků interval alespoň 10 minut.

Nezapomeňte uvědomit svého lékaře nebo lékárníka, o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a), a to i o lécích, které jste si sám/sama zakoupil(a).

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jako všechny léky i přípravek EMADINE může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ty mohou být nepříjemné, většina z nich však rychle odezní.

Obvykle můžete v používání kapek pokračovat, pokud nejsou účinky závažné. Máte-li obavy, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky

(objevují se u 1 až 10 uživatelů ze 100)

Účinky na oko: bolest oka, podráždění oka, rozmazané vidění, skvrny na rohovce, suché oko, svědění oka, červené oko

Celkové nežádoucí účinky: bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky

(objevují se u 1 až 10 uživatelů z 1000)

Účinky na oko: poškození rohovky, abnormální pocit v očích, zvýšené slzení, unavené oči

Celkové nežádoucí účinky: obtíže se spánkem, bolest dutin hlavy, špatná chuť, vyrážka

Není známo:

(četnost výskytu nemůže být vzhledem k dostupným údajům odhadnuta)

Celkové nežádoucí účinky: zvýšená srdeční frekvence

Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK EMADINE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek EMADINE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedeném na ampulce a papírové skládačce za „EXP“ (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C

Ampulku musíte po použití ihned vyhodit. Jeden týden po prvním otevření ochranného fóliového přebalu musí být všechny nespotřebované ampulky vyhozeny.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek EMADINE obsahuje

Léčivou látkou je emedastinum 0.5 mg/ml jako difumarát.

Dalšími složkami jsou: trometamol; chlorid sodný; hypromelosa; čištěná voda. Kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný (k úpravě pH), čištěná voda. Malé množství kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu sodného se přidává proto, aby se udržely normální hodnoty kyselosti (úrovně pH).

Jak přípravek EMADINE vypadá a co obsahuje toto balení

EMADINE je kapalina tekutina (roztok), dodávaná v jednodávkových obalech (ampulkách), o obsahu 0.35 ml. Pět ampulek je baleno pohromadě ve fóliovém přebalu. Balení přípravku EMADINE obsahuje 30 nebo 60 ampulek. Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

**Držitel rozhodnutí o
registraci**

Alcon Laboratories (UK) Ltd.,
Pentagon Park
Boundary Way,
Hemel Hempstead,
Herts., HP2 7UD,
Velká Británie.

Výrobce

Laboratories Alcon,
23 Rue Georges Ferrenbach
F-68240 Kaysersberg
Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci společnosti Alcon.

**België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg**

SA Alcon-Couvreur NV
☎ + 32 (0)3 890 27 11 (België/Belgique/Belgien)

България

Алкон България ЕООД
☎ + 359 2 950 15 65

Česká republika

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
☎ + 420 225 377 333

Danmark

Alcon Danmark A/S
☎ + 45 3636 3434

Deutschland

Alcon Pharma GmbH
☎ + 49 (0)761 1304-0

Ελλάδα

Κύπρος

Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ
☎ + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

Eesti

Alcon Eesti
☎ + 372 6 313 214

España

Alcon Cusí, S.A.
☎ + 34 93 497 7000

France

Laboratoires Alcon
☎ + 33 (0)1 47 10 47 10

Ireland

Malta

United Kingdom

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
☎ + 44 (0) 1442 34 1234 (United Kingdom)

Ísland

Alcon Danmark A/S
☎ + 45 3636 3434

Lietuva

Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė
☎ + 370 5 2 314 756

Magyarország

Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft
☎ + 36-1-463-9080

Nederland

Alcon Nederland BV
☎ + 31 (0) 183 654321

Norge

Alcon Norge AS
☎ + 47 23 25 25 50

Österreich

Alcon Ophthalmika GmbH
☎ + 43 (0)1 596 69 70

Polska

Alcon Polska Sp. z o.o.
☎ + 48 22 820 3450

Portugal

Alcon Portugal-Produtos e Equipamentos
Oftalmológicos, Lda.
☎ + 351 214 400 300

România

S.C. Alcon Romania S.R.L.
☎: + 40 21 203 93 24

Slovenija

Alcon d.o.o.
☎ + 386 1 422 5280

Slovenská republika

Alcon Pharmaceuticals Ltd – oz
☎ + 421 2 5441 0378

Suomi/Finland

Alcon Finland Oy
☎ +358 207 871 600

Italia

Alcon Italia S.p.A.
☎ + 39 02 81803.1

Sverige

Alcon Sverige AB
☎ + 46 (0)8 634 40 00
E-post: receptionen@alconlabs.com

Latvija

Alcon Pharmaceuticals Ltd
☎ + 371 7 321 121

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: Listopad 2010

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uvedeny na webových stránkách Evropské lékové agentury: <http://www.ema.europa.eu>